

2083

Fachklinikum Mainschleife
Orthopädie und Chirurgie

Facharztzentrum
Würzburg

Facharztzentrum
Schweinfurt

Facharztzentrum
Volkach

DPGH 2024 Hannover

Kombinierte SLAC Wrist und Rhizarthrose: Zweizeitiges Vorgehen mit MKTA (Four-Corner-Fusion) und Bipolarer Prothese anhand von 2 Fällen

Dr. Dirk Ziegler Chefarzt Schulter-, Ellenbogen-, und Handchirurgie


Fragestellung: „Meine Hand tut weh“ – Etablierte operative Verfahren der Implantation einer TOUCH Prothese (Fa. Kerlmedical, seit 2013) und /oder einer Mediocarpalen Tellarthrose (1): Diagnostisches und Therapeutisches Vorgehen anhand von 2 Fällen aus der Praxis eines FAZ

Fall 1: Frau, 53-jährig, Kommissioniererin, L. Hand, linksdominant, Polyarthrose: Z.n. Knie TP Li, Z.n. Hüft TP Li, Omarthrose Li (TP geplant),











07/2021



07/2021










+ 1.5 Jahre
04/2023







Diagnostisches Vorgehen:

Klinisch (2)












Sonografisch












Fall 2: Mann, 60-jährig, Bodenverleger, R. Hand, rechtsdominant, ND: Rheumatoide Arthritis (MTX)









11/2021



10/2022








09/2024











R

MKTA geplant für 2025

2024 (3 Jahre nach MKTA und TOUCH):



Ergebnis Sept. 2024 (2 Jahre nach TOUCH):



Pinzettengriff R 4 / L 3.8 kg.
3.5 von 10

Griffkraft R 39.7 / L 50.4 kg. Kraft Pinzettengriff R 9.3 / L 7.5 kg.
Quick DASH 23 Punkte, VAS R 2 / L 0 von 10

Die Untersuchung in Kombination mit einer sonografisch kontrollierten Untersuchung des Handgelenkes kann der Schmerzort lokalisiert werden. Die Arthroseregion kann sicher mit etablierten OP Verfahren (MKTA / Bipolare Prothese) therapiert werden. Der Einbau einer Pfannenkomponente nach MKTA ist möglich. Auch ein einzeitiges Vorgehen denkbar.

Die mediocarpale Tellarthrose des Handgelenkes, Operat Orthop Traumatol 8: 175-184
W. Grifka J (2009): Diagnostik des schmerzhaften Handgelenkes, Orthopädie Vol 38, 213-228

Kontakt:

@gmx.de
www.fachklinikum-mainschleife.de







